

## Reacties op een bijensteek

Indeling op ernst van de reactie (graden van Muller), met de bijbehorende verschijnselen en behandeling.

I-IV treden binnen korte tijd op: 1 minuut-1 uur.

0	Zwelling op plaats van de steek (large local). Kan zelfs na een dag nog optreden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lokale jeuk</li> <li>▪ lokale roodheid en/of</li> <li>▪ lokale zwellingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antihistamine</li> <li>▪ NSAID (bv. Advil)</li> </ul>
I	Huidverschijnselen over het hele lichaam:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ galbulten, netelroos</li> <li>▪ jeuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antihistamine</li> <li>▪ Naar de huisarts</li> <li>▪ Prednison</li> </ul>
II	Algehele roodheid en zwellingen met maag-darm verschijnselen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwellingen op andere plaatsen</li> <li>▪ darmklachten: buikpijn, misselijkheid, braken, diarree</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antihistamine</li> <li>▪ Naar de huisarts</li> <li>▪ Prednison</li> </ul>
III	Ademhalingsverschijnselen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ benauwdheid: piepende ademhaling, hees, dichtgeknepen keel, kortademig</li> <li>▪ sufheid, flauwvallen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 112 bellen</li> <li>▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken</li> </ul>
IV	Vasculaire aandoeningen, Anafylactische shock	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hartkloppingen</li> <li>▪ pijn op de borst</li> <li>▪ bloeddrukdaling</li> <li>▪ urine verlies</li> <li>▪ blauwe handen/voeten</li> <li>▪ bewusteloosheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 112 bellen</li> <li>▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken</li> </ul>